

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕)

เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง
เพิ่มเติมตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวังเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๖. วัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ เฟนเตอมีน, เบนซ์เฟตามีน, แอมฟีพรามोन, มาซินดอล และเฟนไทดเมตราซีน ต้องมีคำเตือนและข้อควรระวังดังนี้

คำเตือน

(๑) คนที่มีอาการกระวนกระวาย มีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ หรือโรคต่อหีน รวมทั้งคนที่เคยติดยาอย่างอื่นมาแล้ว สตรีที่ตั้งครรภ์หรือสตรีในระยะให้นมบุตร ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

(๒) หากมีอาการผื่นขึ้นตามผิวหนัง ลมพิษ หรือมีอาการของโรคจิตให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน

(๓) ผู้ที่แพ้ยาพวกซิมพาโทมิเมติกส์ (sympathomimetics) อื่น ๆ เช่น แอมเฟตามีน (amphetamine) อีเฟดรีน (ephedrine) อีพิเนพรีน (epinephrine) ไอโซโพรเตอรินอล (isoproterenol) เมตาโพรเตอรินอล (metaproterenol) นอร์อีพิเนพรีน (norpinephrine) เฟนิลอีพรีน (phenylephrine) เฟนิลโพรปรานอลามีน (phenylpropranolamine) ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) เทอบิวตาลีน (terbutaline) อาจแพ้วัตถุตำรับนี้ด้วย

(๔) ไม่ควรใช้วัตถุตำรับนี้ติดต่อกันนานเกินหนึ่งสัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง และก่อนหยุดใช้ควรปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง

(๑) อาจทำให้เกิดอาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ ง่วงนอน ไม่มีแรง หรือซึมเศร้า

(๒) อาจทำให้ท้องผูกหรือท้องเดิน วิงเวียน ปวดศีรษะ ตาพร่า คลื่นไส้ อาเจียน ปากคอแห้ง ปวดท้อง เหงื่อออกมาก หรือหัวใจเต้นแรงและเร็ว

(๓) หากจะใช้วัตถุตำรับนี้ร่วมกับยาชนิดอื่น ควรปรึกษาแพทย์เสียก่อนเพราะอาจเกิดอันตรายได้

(๔) เมื่อหยุดใช้ หากมีอาการซึมเศร้า คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มือสั่น หรืออ่อนเพลียผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน

๗. วัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในตราซีแพม ต้องมีข้อควรระวังดังนี้

ข้อควรระวัง

(๑) อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม กล้ามเนื้อเปื่อย มีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะมากกว่าปกติ และมีพฤติกรรมผิดปกติได้

(๒) อาจทำให้เกิดการผิดปกติของเม็ดเลือด ตับ และไตได้

- อาจเกิดอันตรายได้
- วัตถุตำรับนี้
- เมื่อใช้วัตถุตำรับนี้
- (๓) หากจะใช้วัตถุตำรับนี้ร่วมกับยาชนิดอื่นควรปรึกษาแพทย์เสียก่อนเพราะ
 - (๔) สตรีที่ตั้งครรภ์ หรือผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจอย่างรุนแรงไม่ควรใช้
 - (๕) ห้ามดื่มสุรา เครื่องดื่ม อาหารหรือยาที่มีแอลกอฮอล์เมื่อใช้วัตถุตำรับนี้
 - (๖) ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานในที่สูง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ส. พริ้งพวงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๕๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)