

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)

เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง  
เพิ่มเติมตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวังเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๘. วัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ คลอเฟนิเตอมีน คลอเตอมีน เอน เอทิลแอมเฟตามีน และเฟนิลพรามีน ต้องมีคำเตือนและข้อควรระวังดังนี้

### คำเตือน

(๑) คนที่มีอาการกระวนกระวาย มีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ หรือโรคต่อหีน รวมทั้งคนที่เคยติดยาอย่างอื่นมาแล้ว สตรีที่ตั้งครรภ์หรือสตรีในระยะให้นมบุตร ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

(๒) หากมีอาการผื่นขึ้นตามผิวหนัง ลมพิษ หรือมีอาการของโรคจิตให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน

(๓) ผู้ที่แพ้ยาพวกซิมพาโทมิเมติกส์ (sympathomimetics) อื่นๆ เช่น แอมเฟตามีน (amphetamine) อีเฟดรีน (ephedrine) อีพิเนฟริน (epinephrine) ไอโซโพรเทอโรล (isoproterenol) เมตาโพรเทอโรล (metaproterenol) นออีพิเนฟริน (norepinephrine) เฟนิลอีพรีน (phenylephrine) เฟนิลโพรปราโนลามีน (phenylpropranolamine) ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) เทอบิวตาลีน (terbutaline) อาจแพ้วัตถุตำรับนี้ด้วย

(๔) ไม่ควรใช้วัตถุตำรับนี้ติดต่อกันนานเกินหนึ่งสัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง และก่อนหยุดใช้ควรปรึกษาแพทย์

### ข้อควรระวัง

(๑) อาจทำให้เกิดอาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ ง่วงนอน ไม่มีแรง หรือซึมเศร้า

(๒) อาจทำให้ท้องผูกหรือท้องเดิน วิงเวียน ปวดศีรษะ ตาพร่า คลื่นไส้ อาเจียน ปากคอแห้ง ปวดท้อง เหงื่อออกมาก หรือหัวใจเต้นแรงและเร็ว

(๓) หากจะใช้วัตถุตำรับนี้ร่วมกับยาชนิดอื่น ควรปรึกษาแพทย์เสียก่อนเพราะอาจเกิดอันตรายได้

(๔) เมื่อหยุดใช้ หากมีอาการซึมเศร้า คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มือสั่น หรืออ่อนเพลียผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๕

ส. พริ่งพวงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕)